

Diagnoze	Diagnozes kods	Komp. apmērs %	Zāļu vispārīgais nosaukums/ medicīnas ierīce	Zāļu kods ATĶ klasifikācijā	Zāļu/medicīnisko ierīču izrakstīšanas nosacījumi
Aasma	J45.0; J45.1; J45.8; J45.9	75	Fenoterolum	R03AC04	
			Ipratropium/Fenoterolum	R03AK03	
			Salbutamolom	R03AC02	
			Theophyllinum	R03DA04	
			Budesonidum	R03BA02	Suspensija izsmidzināšanai - bērniem līdz 2 g.v. Pulverinhalatori - pacientiem pēc 6 g.v.
			Fluticasonum	R03BA05	1. Bērniem līdz 6 g.v. 2. Pacientiem pēc 6 g.v. ar vidēji smagu un smagu persistējošu astmu, kuriem ar Budesonidum netiek nodrošināta astmas kontrole.
			Ciclesonidum	R03BA08	Pacientiem no 12 g.v. ar vidēji smagu un smagu persistējošu astmu, kuriem ar Budesonidum netiek nodrošināta astmas kontrole.
			Montelukastum	R03DC03	Tikai bērniem līdz 5 gadu vecumam vieglas, vidēji smagas un smagas persistējošas astmas gadījumā. Pieaugušiem un bērniem, kuri vecāki par 5 gadiem, vidēji smagas un smagas persistējošas astmas gadījumā (ja inhalējamo glikokortikoīdu terapijas rezultātā netiek nodrošināta sekmīga astmas kontrole): 1) ar apstiprinātu J45.0 "Pārsvārā alerģiska astma" ("Atopiska astma", "Eksogēna astma"), 2) ar fiziskas slodzes astmu, 3) ar "Aspirīna astmu". Smagas persistējošas bronhiālās astmas gadījumā – pneimonologa kompetencē.
			Methylprednisolonum	H02AB04	
			Prednisolonum	H02AB06	
			Beclometasonum/Formoterolum	R03AK07	Pacientiem ar vidēji smagu persistējošu un smagu persistējošu bronhiālo astmu.
			Budesonidum/Formoterolum	R03AK07	
			Formoterolum	R03AC13	
			Salmeterolum	R03AC12	
		Salmeterolum/Fluticasonum	R03AK06		
		50	Krājītelpas medikamentu inhalācijām		